

Indehaver af dispensation iflg. lægemiddellovens §30:

Orion Pharma Animal Health, Møllevej 9A, 2990 Nivå.

Indehaver af markedsføringstilladelsen i visse andre EU lande:

Pfizer Animal Health.

Fremstiller:

MSD Animal Health, 33 Whakatiki Street, Private Bag 908, Upper Hutt, New Zealand.

Præsentation:

Vaccinen indeholder: *C. perfringens* type A (α), type B & C (β) toxoid og type D (ϵ) toxoid, *C. chauvoei* (whole cell), *C. novyi* toxoid, *C. septicum* toxoid og *C. tetani* toxoid.

Bruges til aktiv immunisering mod sygdomme forårsaget af *C. perfringens* type A, B, C og D, *C. chauvoei*, *C. novyi*, *C. septicum* og *C. tetani*. Desuden til passiv immunisering mod infektioner forårsaget af de nævnte clostridiearter.

Indikationer:

Vaccinen er ikke registreret til svin, men den er godkendt til kvæg og får i visse andre lande. Vaccinen kan med særtilladelse bruges i kvægbesætninger med forskellige clostridieinfektioner og i svinebesætninger, der har spædgrisediarré forårsaget af *Clostridium perfringens* type A, som det er beskrevet nedenfor.

Kontraindikationer:

Kun raske dyr bør vaccineres.

Bivirkninger:

Hævelser på injektionsstedet ses hyppigt hos kvæg og får, sjældent hos svin. Hævelserne forsvinder normalt inden for 3 til 6 uger (får) og 3 til 10 uger (kvæg). Overfølsomhedsreaktioner kan ses lejlighedsvis.

Vaccinationsprogram / brugsvejledning:

Søer og gylte: Vaccinationstidspunktet tilpasses (4 uger før faring) så råmælken har maksimalt indhold af antistoffer.

Får: Vaccinationsforløbet skal være færdigt højst 6 uger og senest 2 uger før læmning for at sikre maksimal immunitet.

Lam: Lam født af fuldt vaccinerede får bør ikke vaccineres før de er 8 til 12 uger gamle (på grund af tilstedeværelse af materielle antistoffer). Lam født af uvaccinerede får kan vaccineres første gang, fra de er 2 uger gamle.

Kvæg: Vaccinationsforløbet skal være færdigt højst 8 uger og senest 2 uger før kælvning for at sikre maksimal immunitet.

Kalve: Kalve født af fuldt vaccinerede køer bør ikke vaccineres, før de er 8 til 12 uger gamle.

Vaccinen omrystes omhyggeligt før brug. Sprøjter og kanyler skal være sterile og injektionen skal gives på siden af halsen. Injektionsstedet skal være tørt og rent.

Dosering:

Søer og gylte. Basisvaccination: 4 ml 10 uger før faring og 4 ml 4 uger før faring dybt intramuskulært.

Får og lam over 8 uger. Basisvaccination: 2 ml og 2 ml 6 uger senere s.c.

Lam 2–8 uger gamle fra uvaccinerede får. Basisvaccination: 2 ml og 2 ml igen 6 uger senere s.c.

Kvæg uanset alder. Basisvaccination: 5 ml og 5 ml igen 6 uger senere s.c.

Revaccination:

Søer. 4 ml før faring i.m. *Får.* 2 ml med 12 måneders interval s.c. *Kvæg.* 5 ml med 12 måneders interval s.c.

Opbevaring og brug:

Tåler ikke frost. Opbevares i køleskab ved 2-8° C, beskyttet mod lys. Anbrudte flasker skal bruges op på samme arbejdsdag. Covexin® 8A må ikke blandes med andre lægemidler eller vacciner.

Udlevering:

Kan rekvireres hos Dianova A/S til anvendelse i besætninger, der har opnået særlig tilladelse fra DTU-Veterinærinstituttet.

Pakninger:

Hætteglas 1 x 50 ml.

