

Vaccinen har ikke markedsføringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, men sælges som ikke-registreret vaccine (iht. Lægemiddelovens §30) og kan rekvireres fra Dianova A/S til anvendelse i besætninger, der har opnået særlig tilladelse fra DTU-Veterinærinstituttet.

INDLÆGSSEDDEL

HYPERMUNE RE

PLASMA TIL HESTE

Præsentation:

Frosset plasma til heste til intravenøs anvendelse efter optøning.

Indeholder equin IgG ≥ 24 g/l, equin Total Protein ≥ 50 g/l og antistoffer mod *Rhodococcus equi* $\geq 40\%$ VIL standard, i en 1 liter human plasmapose.

Indikationer:

1) Til nyfødte føl, der ikke har modtaget colostrum og har et lavt niveau af IgG (mindre end 4 g/l), for at forøge mængden af cirkulerende IgG. En forøget mængde af IgG er påvist ca. 24 timer efter injektion, men varigheden er ikke kendt.

2) Til føl, der har modtaget normal colostrum, for at forøge niveauet af antistoffer mod *Rhodococcus equi*. Det forøgede niveau af antistoffer er påvist ca. 24 timer efter injektion og holder, med en faldende mængde, normalt i op til 21 dage.

Kontraindikationer: Ingen.

Bivirkninger:

Tilsætningsstoffet ACD-A (Acid Citrate Dextrose-A) kan forårsage muskel-fascikulationer, svaghed og abnormal hjerterytme.

Infusions reaktioner, hyperventilering - rystelser og hurtig hjerterytme er meget sjældne.

Anafylaktiske reaktioner er meget sjældne.

Dosering og administration:

1) Føl, der ikke har fået colostrum:

Føl, ca. 50 kg legemsvægt fra 24 timer til 6 dage gamle, 1 liter i.v. (20 ml pr. kg legemsvægt) i løbet af 15 til 20 minutter.

Hvis IgG niveauet efter 24 - 48 timer stadig er lavt, kan man gentage doseringen.

2) Føl, der har modtaget normal colostrum:

1 liter i.v. pr. 50 kg (20 ml pr. kg legemsvægt). For at opretholde et forøget niveau af antistoffer mod *Rhodococcus equi*, kan man give en yderligere dosis ca. 21 dage senere.

Optøning:

Posen lægges i varmt vand (ikke mere end 40 °C). Efterhånden som vandet bliver koldere, kan man supplere med varmt vand. Optøning tager normalt ca. 2 ½ time.

Opbevaring:

Opbevares i en fryser -20 °C til -30 °C.

Specielle forsigtighedsregler:

Giv ikke mere end 2 doser til samme dyr.

Giv ikke anden dosis før 24 timer efter første dosis.

Udlevering:

DTU-Veterinærinstituttet

Produktion:

Veterinary Immunogenics Ltd.

UK

Import:

ScanVet Animal Health A/S

Kongevejen 66

3480 Fredensborg