

Indlægsseddel

Til dyr

NOBILIS® ERYSIPELAS

Injektionsvæske, suspension
Vaccine mod rødsyge hos kalkuner

Deklaration

1 ml indeholder:

Antigen koncentrat (indeholdende mindst 25 IU *E. rhusiopathiae* antigen) 100 mg, dl- α -tocopherolacetat 75 mg, Polysorbat 80 30 mg, simethicon 0,05 mg, NaCl 7,8 mg, tris (hydroxymethyl) aminomethan 0,61 mg, formalin 1,35 mg, vand til injektionsvæsker til 1,0 ml.

Fremstiller

Intervet International B.V., Boxmeer, Holland.

Dansk repræsentant

Intervet Danmark AS, Literbuen 9, 2740 Skovlunde.

Indikationer

Aktiv immunisering af kalkuner mod rødsyge.

Kontraindikationer

Kun raske dyr bør vaccineres.

Bivirkninger

Forbigående hævelse på injektionsstedet kan ses. Allergiske reaktioner kan ses.

Forsigtighedsregler og advarsler

Vaccinen skal have stuetemperatur (15-25°C), før vaccination påbegyndes. Vaccinen bør omrystes før og under brug.

Dyreart

Kalkuner

Dosering og administration

Dosis pr. kalkun er 0,5 ml, som gives subkutant. Vaccination kan ske fra 6 ugers alderen. Vaccination foretages 2 gange med minimum 4 ugers interval. Avlsdyr må ikke revaccineres senere end 2 uger før påbegyndelse af æglægningsperioden.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 0 døgn.

Opbevaring

Opbevares ved 2-8°C.

Holdbarhed efter anbrud: 10 timer ved 15-25°C.

Særlige forsigtighedsregler vedrørende bortskaffelse af ubrugt produkt

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal modtageordning.

 Intervet