

Vaccinen har ikke markedsføringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, men sælges som ikke-registreret vaccine (Iht. Lægemiddelovens §30) og kan rekvireres fra Dianova A/S til anvendelse i besætninger, der har opnået en særlig tilladelse fra DTU-Veterinærinstituttet.

Botullisme vaccine

Præsentation

Vaccine mod botullisme til kvæg (*Clostridium botulinum* toxoid, type C og D)

Virkningsmekanisme/egenskaber

Yder immunisering mod botullisme i ca. 9-12 måneder.

Indikationer

Til immunisering af kvæg mod botullisme

Godkendelse

Vaccinen er ikke godkendt af lægemiddelstyrelsen, men sælges på dispensation fra Veterinærinstituttet.

Deklaration

Clostridium botulinum toxoid, type C og D.

Bemærkning

Kun raske dyr må vaccineres

Vaccine

Vac program:

Kvæg der ikke tidligere er blevet vaccineret, bør gives 2 doser med et interval på 4-7 uger.

Derefter gives 1 injektion årligt. Immuniteten forbedres væsentligt efter den 2. vaccination.

Dosering

Kvæg: 2 ml subkutant

Opbevaring

Opbevares ved 4-8 °C i køleskab.

Må ikke anvendes efter udløbsdatoen på hætteglasset.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 7 dage

Bivirkninger

Ingen kendte.

Udl. Bestem.: BP

Udl. Sted: Veterinærinstituttet

Pakning: 100 ml hætteglas

Fremstiller: OBP - Onderstepoort Biological Products

Dansk repræsentant:

ScanVet Animal Health A/S

Kongevejen 66

DK-3480 Fredensborg